

99,0%

Probabilitat de supervivència més enllà dels 5 anys des de l'inici de tractament en els nous diagnòstics del VIH que no presenten un retard del diagnòstic

79

Casos de SIDA

481

Nous diagnòstics de VIH notificats al registre

59%

Proporció de migrants entre els nous diagnòstics de VIH

6,0

Taxa de nous diagnòstics de VIH per 100.000 habitants

0,44%

Prevalença de VIH en relació a la població general

35.353
persones vivint amb VIH a Catalunya

El Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les ITS/VIH/SIDA de Catalunya (CEEISCAT) es va crear l'any 1995 com a òrgan de suport tècnic al Departament de Salut i a les ONG catalanes del sector en l'àmbit de la prevenció i el control del VIH i altres infeccions de transmissió sexual (ITS). Actualment, el CEEISCAT està ubicat al Campus de Can Ruti i forma part de l'Institut Català d'Oncologia (ICO).

El centre compta amb dos components principals: un de programàtic i un altre de recerca aplicada. El component programàtic està coordinat amb la Subdirecció General d'Addiccions, VIH, Infeccions de Transmissió Sexual i Hepatitis Víriques, i amb el Servei de Vigilància Epidemiològica i Resposta a Emergències de Salut Pública del Departament de Salut, en el marc de la Xarxa de Vigilància Epidemiològica de Catalunya. Pel que fa al component de recerca, aquest s'implementa en el context del Programa de Recerca en Salut Pública i Atenció Primària (CORE) de l'Institut de Recerca Germans Trias i Pujol (IGTP). Els sistemes d'informació i els estudis observacionals que desenvolupa el CEEISCAT constitueixen el Sistema Integrat de Vigilància Epidemiològica de les ITS/VIH/SIDA (SIVES) de Catalunya. Aquest sistema, a més d'informar el Pla de Salut de Catalunya i el Pla d'Acció enfront del VIH/sida/ITS de Catalunya, proporciona la informació necessària per construir un conjunt d'indicadors epidemiològics de referència. Aquests indicadors permeten descriure els patrons de l'epidèmia del VIH/SIDA i altres ITS, identificar-ne els determinants i avaluar les respostes institucionals davant aquestes epidèmies.

Els indicadors estan alineats amb les propostes de diversos organismes internacionals (com UNAIDS, ECDC i WHO), amb l'objectiu de disposar d'informació harmonitzada i comparable per fer el seguiment dels compromisos globals i europeus en la lluita contra el VIH i la SIDA, especialment en el marc de la "Dublin Declaration on Partnership to Fight HIV/AIDS in Europe and Central Asia".

Indicadors epidemiològics clau pel monitoratge i avaluació del VIH/ITS a Catalunya

2023



Generalitat de Catalunya
Departament de Salut





Centre d'Estudis Epidemiològics sobre les Infeccions de Transmissió Sexual i Sida de Catalunya

	Any 2022	Any 2023	
Taxa de casos de clamídia genital per 100.000 habitants	176,4	196,3	+11,3%
Taxa de casos de gonocòccia per 100.000 habitants	140,2	166,5	+18,8%
Taxa de casos de sífilis infecciosa per 100.000 habitants	27,5	31,8	+15,9%
Taxa de casos de limfogranuloma veneri per 100.000 habitants	5,9	9,8	+66,8%


Vies de transmissió segons sexe assignat al néixer

Nous diagnòstics per VIH (+15 anys)



ITS
a Catalunya
respecte la
població general

Cascada de serveis del VIH (2023)



Diagnòstic i tractament

Taxa de proves de detecció del VIH per 1.000 habitants (2022)	55,0	Prevalença de reactivitat en els centres de cribratge comunitari (2023)	0,95%
Diagnòstic tardà del VIH (2023)	47,4%	Estimació de la proporció del nombre de casos de VIH declarats al registre que s'han diagnosticat inicialment en centre comunitaris (2022)	28,4%
Diagnòstic tardà del VIH en persones migrants (2023)	49,4%	Proporció de persones amb una prova VIH reactiva realitzada en un centre comunitari vinculades al sistema sanitari (2022)	67,9%
Proporció de pacients diagnosticats a l'Atenció Primària amb una condició indicadora del VIH als quals se'ls realitza la prova del VIH en els 4 mesos posteriors a la data del diagnòstic en homes (2016)	19,8%	Retenció al tractament als 12 mesos en homes (2023)	94,8%
Proporció de pacients diagnosticats a l'Atenció Primària amb una condició indicadora del VIH als quals se'ls realitza la prova del VIH en els 4 mesos posteriors a la data del diagnòstic en dones (2016)	16,3%	Retenció al tractament als 12 mesos en dones (2023)	91,9%

Indicadors bio-conductuals en poblacions clau

	Dones cis treballadores sexuals (2018)	Homes cis i dones trans que exerceixen el treball sexual (2019)	Homes gais, bisexuals i altres HSH	Persones que s'injecten drogues (2019)	Embarassades <25 anys (2022)	Joves (2024)
Prevalença de VIH	3,0	26,1%	18,9* 2,3**	33,3%		
Prevalença de sífilis						
Prevalença de clamídia	1,8%		12,7%**		6,7%	9,1% (2018)
Prevalença de Micoplasma genitalium					5,8%	1,3% (2018)
Prevalença de VHC		1,0%		74,0%		
Persones que s'han realitzat la prova del VIH i coneixen els seus resultats en els últims 12 mesos	59,3%	82,0%	5%*	97,9%		
Ús del preservatiu en la darrera relació sexual	92,6%	88,5%	56%* 38,9%**	35,5%		49,5%
Edat inici de les relacions sexuals					17 anys	15 anys
Ús de pornografia			*2017 monitoriatge bioconductual ** 2023 Téstate			76,40%